


L'approche révolutionnaire pour lutter contre les rats et les souris

'Enfin, après 30 ans, un nouveau mode d'action'



Période de pré-appâtage

Placez 7 jours avant la période d'appâtage le **Harmonix® Monitoring Paste** dans les boîtes d'appâts. Laissez les rongeurs s'habituer à l'appât. Pendant cette période, vous pouvez également vérifier si les boîtes à appât sont au bon endroit.

Période d'appâtage

Une fois que la pâte de monitoring est bien consommée vous pouvez passer à l'appât : **Harmonix® Rodent Paste**.

Monitoring

Avez-vous l'infestation sous contrôle ?

Oui :

Passez à **Harmonix® Monitoring Paste** pour une surveillance toute l'année.

Non :

Réévaluez la situation IPM avec les questions suivantes :

- Avez-vous (encore) mis en œuvre toutes les mesures préventives ?
- N'avez-vous (toujours) pas de concurrence alimentaire ?
- Avez-vous (toujours) de bonnes installations sanitaires ?
- Avez-vous les boîtes d'appât au bon endroit ?

Une stratégie pour toute l'année

L'approche IPM (programme de lutte intégrée contre les nuisibles) exige que les rats et les souris soient surveillés toute l'année. En conséquence, un contrôle ciblé peut être lancé à temps.

Si la consommation de **Harmonix® Monitoring Paste** est détectée, passez à **Harmonix® Rodent Paste**.

Veillez à inspecter mensuellement les boîtes d'appât :

- ✓ Contrôlez l'éventuelle consommation de **Harmonix® Monitoring Paste**;
- ✓ Remplacez l'appât sale et endommagé;
- ✓ Vérifiez la sécurité des boîtes d'appât.

*Veillez noter qu'après le deuxième placement de l'appât un effet "stop feeding" sera visible. Ceci conduira à moins de consommation de **Harmonix® Rodent Paste** par les rongeurs.*

Timing

Harmonix® Monitoring Paste Harmonix® Rodent Paste



Jour -7

Jour 0 - 34

Jour 35

Pré-appâtage

Jusqu'à 7 jours avant la période d'appâtage, veuillez placer la pâte **Harmonix® Monitoring**. Grâce au pré-appâtage vous aurez plus rapidement et efficacement des bons résultats.

Appâtage

Remplissez les boîtes d'appât avec la pâte **Harmonix® Rodent Paste**. Les stations d'appât doivent être visitées au minimum tous les jours ou tous les 2 jours au début du traitement, et au moins une fois par semaine par la suite. Afin de vérifier si l'appât est accepté.

- ✓ Vérifiez l'absorption de **Harmonix® Rodent Paste**;
- ✓ Remplissez à nouveau les boîtes d'appât avec **Harmonix® Rodent Paste**, de manière à ce qu'il y en ait assez jusqu'à votre prochain contrôle;
- ✓ Remplacez tout appât sale et endommagé;
- ✓ Enlevez les rongeurs morts par mesure d'hygiène;
- ✓ Vérifiez la sécurité des boîtes d'appât.

Evaluation

Vous ne constatez plus de consommation ou vous n'avez plus de dégâts dû au rongeurs ? Traitement réussi ! Remplacez **Harmonix® Monitoring** afin de prendre des mesures en temps opportun si nécessaire.

Effet «Stop feeding» : Le cholécalférol provoque une forte diminution de l'appétit. Cela se produit après deux jours, même avec un dosage sublégal. Les dommages causés par les rongeurs sont stoppés plus tôt, car leur recherche de nourriture est considérablement réduite.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Numéro d'autorisation : NL-0024897-0000 / BE: BE2020-0019 / GD Lux 275/20/L-000



Harmonix®
Rodent Paste