

# Phobi Fenox EC

Numéro d'article: 1103078218

## Formulation

<b>Substance active</b>	Etofenprox 300gr/L Pyrethrum 1gr/L	
<b>Formulation</b>	Concentré émulsionnable	
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	professionnels	
<b>Mentions de danger</b>		

## Organisme(s) cible(s)

Cimex lectularius	Rhyzopertha dominica
Blattella germanica	Oryzaephilus surinamensis
Tribolium confusum	Lasioderma serricorne
Sitophilus oryzae	Insectes rampants, y compris les cafards

## Domaine(s) d'utilisation

Intérieur des bâtiments (collectivités, IAA, maisons privées)
---------------------------------------------------------------

## Fréquence d'application et dose(s) à appliquer

<b>Dilution</b>	Dilution 50 ml de produit dans 5 L d'eau par 100m <sup>2</sup>
<b>Nombre et fréquence des applications</b>	2 applications maximum par an. Punaises de lit & SPP: Une deuxième application est nécessaire après 15 jours.
<b>L'efficacité résiduelle</b>	Jusqu'à 12 semaines. L'efficacité résiduelle est de 2 semaines lorsqu'il est appliqué contre les insectes ravageurs des denrées stockées et es punaises de lit.
<b>L'effet biocide</b>	L'effet biocide apparaît en quelques minutes.

## Consignes d'utilisation spécifiques

Tenir compte du cycle de vie et des caractéristiques des insectes cibles pour adapter les traitements. En particulier, cibler le stade de développement le plus sensible de l'organisme cible, le moment des applications et les zones à traiter.
Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et autres mesures d'hygiène publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.).
Eviter l'usage exclusif et répétitif d'insecticides du même sous-groupe chimique. Selon le classement des modes d'action de l'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), l'Etofenprox fait partie du sous-groupe 3A.
Le produit doit être appliqué sur des surfaces restreintes non régulièrement lavées, qui peuvent être un refuge pour les punaises de lit, telles que sur le sommier, les pieds de lits, sous les meubles, le long des plinthes, derrière la tête de lit, sur le mur derrière le lit et les meubles, et dans les trous et fissures.

## Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques, une combinaison imperméable et un masque respiratoire (APF 4) lors du mixage, de la pulvérisation et du nettoyage.
Pour la literie, l'application doit être restreinte au cadre de lit et au sommier. Ne pas appliquer sur le matelas, le linge de lit et les oreillers. Le matelas, le linge de lit et les oreillers doivent être traités par d'autres méthodes..

## Numéro d'autorisation

<b>Pays Bas</b>	NL-0031567-0000
<b>Belgique</b>	BE2024-0010
<b>Luxembourg</b>	LU0012734-0000