

Phobi Fenox EC

Artikelnr.: 1103078218

Formulering

Werkzame stof(fen)	Etofenprox 300gr/L Pyrethrum 1gr/L	
Formulering	Emulgeerbaar concentraat	
Gebruikers	Professioneel	
Gevarenaanduidingen		

Doelorganisme(n)

Bedwantsen	Kleine graanboorder
Duitse kakkerlakken	Oosterse kakkerlakken
Getande graankever	Tabakskever
Gewone rijstmeelkever	Kruipende insecten, overig

Toepassingsgebied(en)

Binnen in gebouwen (Openbare gebouwen, agrovoedingsindustrie, privéwoningen)
--

Dosering(en) en frequentie

Verdunning	Spuitvloeistof: 50 ml Phobi Fenox EC in 5 L water / 100m ²
Aantal en timing	Max. 2 toepassingen per jaar Bedwantsen: behandeling herhalen na 15 dagen
Residueel effect	Tot 12 weken bij behandeling tegen kakkerlakken en bedwantsen. Tot 2 weken na toepassing tegen voorraad aantastende insecten.
Knock-down effect	Binnen enkele minuten na behandeling

Gebruiksaanwijzing

Houd rekening met de levenscyclus en de kenmerken van het doelorganisme. Behandel het meest gevoelige ontwikkelingsstadium en pas het moment van toepassing en de te behandelen zone hierop aan.
Pas geïntegreerde beheermethodes toe zoals de combinatie van chemische, fysische bestrijdingsmethoden en hygiëne maatregelen.
Vermijd het exclusieve en herhaaldelijke gebruik van insecticiden van dezelfde chemische subgroep. Etofenprox behoort tot de IRAC subgroep 3A.
Het product alleen toepassen op moeilijk toegankelijke plekken, op oppervlakken die niet regelmatig worden schoongemaakt zoals onder meubels en in naden en kieren waarin insecten zich verschuilen.

Risico beperkende maatregelen

Draag tijdens toepassing een chemisch bestendige en vloeistofdichte overall (Cat III, type 6), chemisch bestendige handschoenen en geschikte ademhalingsbescherming.
Bedwantsen: Uitsluitend het bedkader en lattenbodem behandelen. Niet toepassen op het matras, het beddengoed en hoofdkussens. Deze met een andere methode behandelen.

Registratienummers

Nederland	NL-0031567-0000
België	BE2024-0010
Luxemburg	LU0012734-0000